

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 20-6-70 075225

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 92.06.25 et (56) 92.26.94)

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

ABONNEMENT ANNUEL

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON
C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 117 de Juin 1970

1970-18

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou : Les premiers foyers très localisés, signalés en fin de mois, ne se sont pas étendus, ce qui confirme une mauvaise évolution des oeufs d'hiver.

Néanmoins, en raison de la végétation toujours très active et du délavage des produits par les pluies d'orages souvent violentes, il serait utile d'effectuer un nouveau traitement dès à présent.

Dans les zones où les pluies ont été faibles, ce traitement pourrait être reporté au début de la semaine prochaine.

Black-Rot : Le traitement conseillé ci-dessus sera également valable contre le Black-Rot.

INFORMATIONS

Oïdium : L'Oïdium est en progrès. En cette période de floraison, prévoir un traitement, de préférence par poudrage, dans le courant de la semaine prochaine. Il est particulièrement conseillé dans les foyers.

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les projections d'ascospores sont maintenant terminées.

Il conviendra donc de ne continuer la protection que dans les vergers où les taches primaires ont été observées sur les feuilles ou sur les fruits.

Carpocapse des Pommes et des Poires : Le vol se poursuit et les conditions climatiques restent favorables aux pontes. En conséquence appliquer une seconde pulvérisation insecticide au début de la semaine prochaine.

Carpocapse des Prunes : Les infestations deviennent importantes et dans certains vergers mal protégés dépassent 10% des fruits. Il est donc recommandé d'effectuer un nouveau traitement à partir du 20 juin.

Araignées rouges (Panonychus ulmi) : Les conditions climatiques ont été favorables à l'évolution des araignées rouges au cours de la dernière décade de mai et le début du mois de juin. Par contre, la dernière période orageuse paraît avoir légèrement diminué les pullulations.

Nous rappelons que le traitement ne doit être envisagé que lorsque les populations d'acarions atteignent au moins 30 à 50 formes mobiles par feuille. Au-dessous de ce seuil, leur nuisibilité est trop faible pour justifier une intervention.

.../...

1388

.../...

INFORMATIONS

Rouille du Prunier : Effectuer un nouveau traitement pour prévenir les attaques de Rouille.

Coryneum du Pêcher : Dans différents vergers on observe un développement parfois important de la maladie sur les feuilles, les rameaux et les fruits.

Pour éviter son extension appliquer un traitement avec une spécialité à base de Thirame ou de Captane.

Anthracnose et Bactériose du Noyer : Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à l'évolution et à l'extension de ces deux maladies.

Pour prévenir les nouvelles contaminations sur la végétation en croissance active nous conseillons d'appliquer une bouillie cuprique à la dose habituelle de 150 grs de Cuivre métal par hectolitre.

POMMES DE TERRE

Mildiou et Doryphore : Un traitement contre le Mildiou devrait être appliqué dès à présent dans toutes les cultures de pommes de terre.

Adjoindre un insecticide lorsqu'on observe la présence de larves de Doryphore.

Bordeaux, le 17 juin 1970

L'Ingénieur en Chef et l'Ingénieur d'Agronomie	L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
chargés des Avertissements Agricoles	Chef de la Circonscription Phytosanitaire
	Aquitaine
C. ROUSSEL et J. TOUZEAU	M. LARCE